



DISTINTOS TEST DE EMBARAZO

Existen varias pruebas que pueden ayudar a determinar si estás embarazada, cada una con su propio nivel de precisión. Todas ellas se basan en la detección de la hormona gonadotropina coriónica humana (hCG). Esta hormona es producida por el tejido embrionario para evitar que el cuerpo lúteo desaparezca, permitiendo así que el embarazo siga adelante. Empieza a producirse en el momento de la implantación, (entre el 6º y el 10º día tras la fecundación), siendo detectable en sangre a partir del día 11 y en orina unas dos semanas después de la fecundación, es decir, cuatro semanas después de la última regla.

TEST EN ORINA


Las pruebas de embarazo caseras son las más accesibles y comúnmente utilizadas. Estas pruebas detectan la presencia de hCG en la orina. Su mecanismo es muy sencillo, coloca la tira reactiva de la prueba en contacto con la orina.



Las pruebas de orina son bastante fiables cuando se utilizan correctamente y si se espera a haber tenido ya alguna falta en el periodo menstrual. Los falsos positivos son raros, pero pueden ocurrir debido a la presencia de ciertos medicamentos, algunas condiciones médicas o la reciente pérdida de un embarazo. Los falsos negativos pueden ocurrir si la prueba se realiza demasiado pronto, cuando los niveles de hCG son todavía bajos. Para reducir la posibilidad de un falso negativo, se recomienda realizar la prueba con la primera orina de la mañana, que contiene una mayor concentración de hCG.

TEST EN SANGRE

Las pruebas en sangre para detectar el embarazo pueden detectar niveles más bajos de hCG en comparación con las pruebas de orina, por lo que pueden detectar un embarazo incluso antes de la primera falta. Los falsos positivos son extremadamente raros, (algunos tumores pueden producir hCG). Los falsos negativos también son raros, pero pueden producirse si la prueba se realiza demasiado pronto o por errores en el procesamiento de la muestra.



ECOGRAFÍA

El ultrasonido transvaginal puede confirmar un embarazo mediante la visualización del saco gestacional dentro del útero. Sin embargo, debemos esperar hasta la semana 5 para poder visualizar el embarazo, (en ocasiones incluso más). Es por ello que suelen preferirse las pruebas analíticas, ya sea en sangre o en orina, salvo que exista sospecha de aborto o embarazo ectópico (fuera del útero).

*La ecografía abdominal tiene peor visualización, por lo que suele preferirse la vía vaginal en la gestación precoz.

